

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ГРАММИДИН® С АНЕСТЕТИКОМ НЕО

Торговое наименование препарата: Граммидин® с анестетиком нео

Действующие вещества (МНН): грамицидин С + оксibuпрокаин + цетилпиридиния хлорид

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав:

Одна таблетка содержит:

активные вещества:

грамицидина С дигидрохлорид – 3,20 мг (в пересчете на грамицидин С – 3,00 мг);

оксibuпрокаина гидрохлорид – 0,20 мг;

цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг);

вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный, тальк, ацесульфам калия, ароматизатор мятный, сорбитол, магния стеарат.

Описание: круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета с тиснением «GR» на одной стороне.

Фармакотерапевтическая группа: антибиотик + местноанестезирующее средство + антисептическое средство.

Код АТХ: R02AB30

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С, местноанестезирующее (обезболивающее) средство – оксibuпрокаин и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Анестетик оксibuпрокаин оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта и горла. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает обезболивающий эффект, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, гингивит, стоматит.

Способ применения и дозы

Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в день.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата, временная потеря чувствительности языка.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- детский возраст до 4 лет;
- беременность (I триместр).

Лекарственные взаимодействия

Граммидин® с анестетиком нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Особые указания

Применение при беременности и в период лактации

Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Препарат не влияет на способность выполнять потенциально опасные виды деятельности, требующие особого внимания и быстроты реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

По 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой.

2 контурные упаковки по 9 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель:

АО «Валента Фарм»

141108, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Тел.: +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

Представительство АО «Валента Фарм» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 4 Б, офис 309.

Тел.: (+99893) 180 19 15.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по цифровой маркировке на территории Республики Узбекистан:

Представительство АО «Валента Фарм» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 4 Б, офис 309.

Тел.: (+99893) 180 19 15.