



ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ

Препаратнинг савдо номи: Граммидин® детский

Таъсир этувчи моддалар (ХПН): Грамицидин С + Цетилпиридин хлориди

Дори шакли: маҳаллий қўллаш учун дозаланган спрей

Таркиби:

Препаратнинг бир дозаси қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: грамицидин С дигидрохлориди - 0,0319 мг (грамицидин С га қайта ҳисоблаганда - 0,03 мг), цетилпиридин хлориди - 0,10 мг.

ёрдамчи моддалар:

Этанол 96 % - 9,50 мг.

Сукралоза - 0,20 мг.

Глицерол - 33,20 мг.

Малина ароматизатори - 0,40 мг.

Лимон кислотаси моногидрати - 0,058 мг.

Натрий цитрати - 0,022 мг.

Полисорбат 80 - 0,40 мг.

Метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 0,184 мг.

Пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен) - 0,02 мг.

Тозаланган сув - 0,20 мл гача.

Таърифи: тиниқ ёки товланувчан, рангсиз ёки сарғиш тусли малинага хос ҳидли эритма.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Антибиотик+антисептик восита.

АТХ коди: R02AA20

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Томоқ ва оғиз бўшлиғининг инфекцион-яллиғланиш касалликларини симптоматик даволаш учун қўлланадиган мажмуавий препарат.

Препаратнинг таркибига микробларга қарши восита грамицидин С ва антисептик восита – цетилпиридин хлориди киради. Грамицидин С нинг таъсир механизми микроб хужайраси цитоплазматик мембранасининг ўтказувчанлигини ошиши билан боғлиқ бўлиб, бу унинг чидамлилигини бузади ва ўлимини чакиради. Грамицидин С нинг граммусбат ва грамманфий микроорганизмларнинг кенг доирасига нисбатан антибактериал (бактерицид) таъсир кўрсатади. Цетилпиридин хлориди антисептик воситаларга мансуб бўлиб, оғиз бўшлиғи ва томоқ инфекцион касалликлари қўзғатувчиларининг ўсиши ва кўпайишини бостиради. Препарат микробларга қарши таъсир кўрсатади, яллиғланишни камайтиради, томоқда нохуш ҳисларни енгиллаштиради, ютишни енгиллаштиради.

Фармакокинетикаси

Препарат маҳаллий таъсирга эга. Клиникагача бўлган фармакокинетик тадқиқотларнинг маълумотлари бўйича деярли сўрилмайди.

Қўлланилиши

Оғиз бўшлиғи ва томоқнинг инфекцион-яллиғланиш касалликлари: фарингит, тонзилит, пародонтит, гингивит, стоматитни симптоматик даволашда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Оғиз бўшлиғининг шиллиқ қавати ва томоққа пуркаш йўли билан маҳаллий қўлланади. Овқатдан кейин қўлланилади.

Спрейни биринчи марта ишлатишдан олдин баллонни силкитинг ва босиш қурилмасини икки марта босинг.

6 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар учун дозалаш: бир қўллашга 4 пуркашдан кунига 3 марта 7 кун давомида.

3 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар учун дозалаш: бир қўллашга 2 пуркашдан кунига 3 марта 7 кун давомида.

Препаратни бевосита қўллагандан кейин овқат ва ичимликларни 1 соат давомида қабул қилишдан сақланиш лозим.

Агар даволанишдан кейин яхшиланиш кузатилмаса ёки симптомлар чуқурлашса, ёки янги симптомлар пайдо бўлса, шифокор билан маслаҳатлашиш зарур.

Препаратни фақат йўриқномада кўрсатилган кўрсатмаларга, қўллаш усули ва дозаларига мувофиқ қўланг.

Ножўя таъсирлари

Препаратнинг компонентларига аллергия реакциялар бўлиши мумкин.

Агар Сизда йўриқномада кўрсатилган ножўя самаралар кузатилса, ёки улар чуқурлашса, ёки Сиз йўриқномада кўрсатилмаган бошқа ҳар қандай ножўя самараларни сезсангиз, бу ҳақида шифокорга хабар беринг.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- грамицидин С га, цетилпиридин хлоридга ва препаратнинг бошқа компонентларига юқори сезувчанлик;
- лактация даври;
- 3 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ҳозирги вақтгача бошқа дори воситалари билан клиник аҳамиятли бўлган ўзаро таъсири ҳақидаги ҳолатлар кўрсатилмаган.

Махсус кўрсатмалар

Препаратни оғиз бўшлиғида очик жароҳатлар мавжуд бўлса қўллаш мумкин эмас, чунки цетилперидин хлориди жароҳатларни битишини секинлаштиради.

Препарат этанол сақлайди. Препаратнинг бир марталик максимал дозасида 0,04 г гача этанол сақланади.

Ҳомиладорликда эҳтиёткорлик билан қўлланилади (“Ҳомиладорликда ва эмизиш даврида қўлланилиши” га қаранг).

Ҳомиладорликда ва эмизиш даврида қўлланилиши

Препаратни агар она учун потенциал фойда, ҳомила учун бўлиши мумкин бўлган хавфдан устун бўлсагина қўллаш мумкин. Препаратни қўллашдан олдин, агар Сиз ҳомиладор бўлсангиз ёки Сиз ҳомиладор бўлишим мумкин деб гумон қилсангиз, ёки ҳомиладорликни режалаштираётган бўлсангиз препаратни қўллашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашиш зарур.

Препарат компонентларини кўкрак сутига кириши тўғрисида маълумотлар йўқ. Лактация даврида препаратни қўллаш зарурати бўлганида эмизишни тўхтатиш лозим.

Транспорт воситаларини, механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат махсус диққатни ва тезкор реакцияларни талаб этувчи потенциал хавфли фаолият турларини (автомобилни ва бошқа транспорт воситаларини бошқариш, ҳаракатланувчи механизмлар билан ишлаш, диспетчер ва оператор иши ва бошқалар) бажаришга таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Симптомлари: препаратни тавсия этилганидан юқори дозаларда қабул қилиш, меъда-ичак йўллари томонидан бактериал микрофлорани ўзгариши оқибатида бузилишларни: кўнгил айланиши, қусиш, диареяни чақириши мумкин.

Даволаш: препаратни қабул қилишни тўхтатиш ва шифокорга мурожаат қилиш лозим.

Чиқарилиш шакли

Маҳаллий қўллаш учун дозаланган спрей 0,03 мг + 0,1 мг/доза.

112 дозадан дозаловчи қурилма ва тахланадиган канюлали босиш қурилмаси билан жиҳозланган алюмин флаконда.

1 флакондан тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон кутида.

Сақлаш шароитлари

Оригинал ўрамида, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи корхона

Делфарм Бладель Б.В.

Индустриег 1, Бладель, 5531AD, Нидерландия.

Қадоқловчи корхона

«Валента Фарм» АЖ

141108, Россия, Москва вилояти, Щелково ш., Фабричная кўч., 2 уй

Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситалари сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)ни қабул қилувчи ва уларни рақамли идентификацияси учун жавобгар ташкилотнинг номланиши ва манзили

Ўзбекистон Республикасида "Валента Фарм" АЖ Ваколатхонаси

100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Афросиёб кўч., 4 Б, 309-офис.

Тел.: (+99893) 180 19 15